

## RÉGIONS DU COU

Le **cou** est **allongé** dans la plupart des animaux domestiques, en **particulier chez le cheval**, où on le nomme **encolure**. Chez les **mammifères domestiques**, il est **aplati** d'un côté à l'autre ; il présente un **bord dorsal**, un **bord ventral**, **deux (02) faces latérales**, une **extrémité qui porte la tête** et une **extrémité thoracique plus épaisse** appelée **base**.

### I/ **Le bord dorsal :**

Il est **bien saillant** chez les animaux domestiques ; il est beaucoup **plus épais** chez les carnivores que chez les ruminants et surtout les équidés. Chez le cheval, il donne implantation à la **crinière**.

### II/ **Le bord ventral :**

Il est **plus court** que le précédent et en général **arrondi** et **épais**. Il correspond à la **région trachéale**. Celle-ci est large près de la tête, où elle commence par un relief de la gorge ; elle se termine en une **longue pointe** devant le poitrail. Chez le **bœuf**, le bord ventral du cou porte un **long pli cutané médian** qui se prolonge jusque sous le poitrail : c'est le fanon.

### III/ **Les faces latérales :**

Chaque face latérale, **plus large** vers le thorax que vers dans la tête, présente plusieurs régions :

- **Région cervicale dorsale** ; entre cette saillie et le bord dorsal se trouve un **méplat triangulaire et allongé**, qui s'**élargit** vers le thorax.

- **Région cervicale moyenne** ; une **saillie plus ou moins nette**, allongée en croisant légèrement l'axe du cou, correspond aux vertèbres et forme le **noyau cervical**.

- **Région cervicale ventrale (*Regio colli ventralis*)** ; se trouve ventralement à l'axe vertébral, et elle n'a pas la même disposition dans toutes les espèces :

- **Chez les équidés et les ruminants** ; on y trouve le **sillon jugulaire** qui commence à la région parotidienne et converge au-devant du poitrail vers celle du côté opposé.

- **Chez les carnivores** ; **il n'y a pas de véritable sillon jugulaire**.

### IV/ **L'extrémité crâniale :**

C'est la région la **plus étroite**, elle se raccorde à la tête par les régions suivantes :

- **Dorsalement** ; la **nuque** unit le bord dorsal du cou à l'occiput, elle est **arrondie** d'un côté à l'autre.

- **Latéralement** ; la **région parotidienne** forme entre la région massétérique et l'extrémité crâniale de la région brachio-céphalique une dépression plus ou moins marquée : le **creux parotidien** ou **fosse rétro-mandibulaire (*Fossa retromandibularis*)**.

- **Ventralement** ; la **gorge** a pour base anatomique le **larynx** et forme la **région laryngée**.

### V/ **La base du cou :**

Elle est **beaucoup plus large** que l'extrémité céphalique, s'unit au thorax et à l'épaule par les régions du garrot, du poitrail et pré-scapulaire.

